

Infections transmissibles sexuellement au Canada

**Symposium préliminaire à la conférence de la ISSTDR sur la
notification aux partenaires**

Ville de Québec, 10 juillet 2011

Tom Wong, MD, M.H.P. FRCPC

Directeur

Lignes directrices professionnelles et Division de la pratique en santé
publique


Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections

Direction générale de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses


Aperçu

- Données tirées d'une surveillance régulière et accrue des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) à déclaration obligatoire
- Lignes directrices canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement et notification aux partenaires


Déclaration systématique des maladies à déclaration obligatoire nationale



Cas déclarés et taux de gonorrhée au Canada en fonction du sexe, de 1991 à 2009



Cas déclarés et taux de syphilis infectieuse au Canada en fonction du sexe, de 1993 à 2009



Cas déclarés et taux de syphilis congénitale précoce confirmée au Canada, de 2000 à 2009

Année	Total des cas déclarés	Taux (par 100 000 naissances vivantes)
2000	2	0,610
2001	1	0,300
2002	3	0,912
2003	2	0,597
2004	0	0,000
2005	8	2,338
2006	7	1,974
2007	8	2,175
2008	6	1,602
2009	10	2,629

Prévalence des infections transmissibles sexuellement et par le sang chez les jeunes de la rue (N=6052)* âgés de 15 à 24 ans qui ont pris part à l'étude Surveillance accrue des jeunes de la rue (1999-2006)

	Dans l'ensemble (%)	Homme (%)	Femmes (%)	HRSH	UDI
Résultats aux tests des ITSS					
Chlamydia	10,3	8,7	13	4,7	10,4
Gonorrhée	1,9	1,4	2,6	1	2
VHS-2	16,2	10	25,6	11,9	24,3
VHC	4,5	3,9	5,3	7,3	18,2
VIH	0,8	0,9	0,6	3	1,8

Lignes directrices canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement

- Élaborées par l'Agence de la santé publique du Canada de concert avec un groupe d'experts provenant de partout au Canada.

Syphilis ◦ VIH ◦ Chlamydia ◦ Herpès
Condylomes ◦ Gonorrhée ◦ LGV ◦ Syphilis ◦
VIH ◦ Chlamydia ◦ Herpès ◦ Condylomes ◦
Gonorrhée ◦ LGV ◦ Syphilis ◦ VIH ◦
Chlamydia ◦ Herpès ◦ Condylomes ◦ Gonorrhée
LGV ◦ Syphilis ◦ VIH ◦ Chlamydia ◦
Herpès ◦ Condylomes ◦ Gonorrhée ◦ LGV
Syphilis ◦ VIH ◦ Chlamydia ◦ Herpès

**Lignes directrices
canadiennes sur les
infections transmissibles
sexuellement**

Lignes directrices canadiennes sur les ITS · Lignes directrices
canadiennes sur les ITS · Lignes directrices canadiennes sur les
sur les ITS · Lignes directrices canadiennes sur les ITS · Lignes
Lignes directrices canadiennes sur les ITS · Lignes directrices
canadiennes sur les ITS · Lignes directrices canadiennes sur les
sur les ITS · Lignes directrices canadiennes sur les ITS · Lignes

 Agence de la santé
publique du Canada Public Health
Agency of Canada



Syphilis

Révisé : janvier 2010

Étiologie	1
Épidémiologie	1
Transmission	2
Prévention et contrôle	2
Manifestations	3
Diagnostic	4
Prise en charge	13
Traitement	15
Désensibilisation à la pénicilline	19
Prise en considération d'autres ITS	20
Déclaration des cas et notification aux partenaires	21
Suivi	21
Considérations spéciales	23

Propagation des ITS et du VIH sans notification aux partenaires

